


ご紹介したのは一部の症例経過で、全ての症例が写真と同じ経過を示すわけではありません。

83歳
男性



▲赤みがあらわれやすい時期



▲病変の消失を維持




▲再発を認めず。
皮膚の状態も良好

※ベセルナクリーム塗布により、
お薬の成分が作用するため、
患部やその周辺に赤み(紅斑)
やかさぶた(痂皮)、むくみ(浮腫)
などがあらわれることがあ
ります。

ベセルナクリーム5%塗布による治療経過例

ベセルナクリームを
処方される
患者さんご説明用

ご紹介したのは一部の症例経過で、全ての症例が写真と同じ経過を示すわけではありません。

70歳
女性

1 治療前



2 コース1塗布4週後

3 4週間休薬後
(コース2開始前)

赤みがあらわれやすい時期

4 コース2塗布4週後

コース2ではコース1ほど
強い赤みは出ていない

5 コース2終了8週後



病変消失

6 治療終了1年後

再発を認めず。
皮膚の状態も良好

※ベセルナクリーム塗布により、
お薬の成分が作用するため、
患部やその周辺に赤み(紅斑)
やかさぶた(痂皮)、むくみ(浮腫)
などがあらわれることがあり
ます。

写真提供：高知大学医学部附属病院 皮膚科 横川 真紀 先生