

経皮鎮痛消炎剤
ケトプロフェンテープ20mg「BMD」
ケトプロフェンテープ40mg「BMD」
ケトプロフェン含有プラスター剤

使用上の注意改訂のご案内

製造販売元 株式会社ビオメディクス／販売 持田製薬株式会社

この度、標記製品の「使用上の注意」を改訂しましたのでお知らせ致します。
今後のご使用に際しましては、下記内容にご留意くださいますようお願い致します。
また、改訂後の「使用上の注意」全文につきましては、改訂添付文書をご参照くださいますようお願い申し上げます。

■ 改訂内容（改訂箇所のみ抜粋）

___部：追記（自主改訂）

改訂後	改訂前														
【使用上の注意】 4. 副作用 (2) その他の副作用	【使用上の注意】 4. 副作用 (2) その他の副作用														
<table border="1"><thead><tr><th>頻度 分類</th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td>皮膚^{注)}</td><td>局所の発疹、発赤、腫脹、痒痒感、刺激感、水疱・びらん、色素沈着、皮下出血、皮膚剥脱等</td></tr><tr><td>過敏症^{注)}</td><td>蕁麻疹、眼瞼浮腫、顔面浮腫</td></tr><tr><td>消化器</td><td>消化性潰瘍</td></tr></tbody></table>	頻度 分類	頻度不明	皮膚 ^{注)}	局所の発疹、発赤、腫脹、痒痒感、刺激感、水疱・びらん、色素沈着、皮下出血、皮膚剥脱等	過敏症 ^{注)}	蕁麻疹、眼瞼浮腫、顔面浮腫	消化器	消化性潰瘍	<table border="1"><thead><tr><th>頻度 分類</th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td>皮膚^{注)}</td><td>局所の発疹、発赤、腫脹、痒痒感、刺激感、水疱・びらん、色素沈着、皮下出血、皮膚剥脱等</td></tr><tr><td>過敏症^{注)}</td><td>蕁麻疹、眼瞼浮腫、顔面浮腫</td></tr></tbody></table>	頻度 分類	頻度不明	皮膚 ^{注)}	局所の発疹、発赤、腫脹、痒痒感、刺激感、水疱・びらん、色素沈着、皮下出血、皮膚剥脱等	過敏症 ^{注)}	蕁麻疹、眼瞼浮腫、顔面浮腫
頻度 分類	頻度不明														
皮膚 ^{注)}	局所の発疹、発赤、腫脹、痒痒感、刺激感、水疱・びらん、色素沈着、皮下出血、皮膚剥脱等														
過敏症 ^{注)}	蕁麻疹、眼瞼浮腫、顔面浮腫														
消化器	消化性潰瘍														
頻度 分類	頻度不明														
皮膚 ^{注)}	局所の発疹、発赤、腫脹、痒痒感、刺激感、水疱・びらん、色素沈着、皮下出血、皮膚剥脱等														
過敏症 ^{注)}	蕁麻疹、眼瞼浮腫、顔面浮腫														
注)このような症状があらわれた場合は直ちに使用を中止すること。	注)このような症状があらわれた場合は直ちに使用を中止すること。														

■ 改訂理由

先発製剤の自主改訂（症例集積）に伴い、本剤においても「4. 副作用（2）その他の副作用」の項を改訂致します。

【この「使用上の注意改訂」の内容は、医薬品安全対策情報（DSU）No.269に掲載される予定です。】

- 医薬品医療機器総合機構ホームページ（<http://www.pmda.go.jp/>）に最新添付文書並びにDSUが掲載されます。
- 最新添付文書は弊社ホームページ（<http://www.mochida.co.jp/>）にてご覧いただけます。