※２０２２年８月改訂
２０２０年３月

持田製薬株式会社

医薬品の封に関する取扱い等について

平成 30 年 8 月 1 日付で厚生労働省医薬・生活衛生局長より発出された「医薬品の封の取扱い等について」（薬生発 0801 第 1 号）を受け、弊社製品の個装箱に関して、未開封の確認方法及び正しい開封方法を弊社医療関係者向けホームページで周知することと致しました。

弊社製品の封の種類は、大きく分けて「封緘テープ」と「糊付け」の２つがあります。それぞれの代表例として、「トレプロスト注射液 200mg」、「エパデールカプセル 300」、「レクサプロ錠 10mg」、「トロンビン液モチダソフトボトル 1 万」を掲載致します。

以上

※改訂箇所

「リアルダ錠 1200 mg」の個装箱開封口の形状変更に伴い、
代表例を「エパデールカプセル 300」に変更。

封緘テープ　＜例＞トレプロスト注射液 200 mg

未開封の確認方法及び正しい開封方法

①未開封の状態

- ✓ ミシン目が切れていないこと
- ✓ 封かんテープがしっかり貼付されていること
- ✓ 箱全体に不自然な破れ等が無いこと

を確認してください。

②開封方法

ミシン目に沿って押し破ってください。

③開封後の状態

注意：以下の場合はすでに開封されている可能性があります。



ミシン目が切れている

封緘テープが切れている、
または、剥がれている

糊付け(ミシン目開封あり) ＜例＞エパデールカプセル 300

未開封の確認方法及び正しい開封方法

①未開封の状態

- ✓ ミシン目が切れていないこと
- ✓ 箱全体に不自然な破れ等が無いこと

を確認してください。





②開封方法

↑部を上に引いて、ミシン目を破って開けてください。



③開封後の状態

注意：以下の場合はすでに開封されている可能性があります。

ミシン目が切れている、あるいは
『開封口』表示の下に『開封済』表示がある。

ミシン目が切れている

糊付け(ミシン目開封あり) ＜例＞レクサプロ錠 10 mg

未開封の確認方法及び正しい開封方法

①未開封の状態

- ✓ ミシン目が切れていないこと
- ✓ 箱全体に不自然な破れ等が無いこと

を確認してください。

②開封方法

→部を右に引いて、ミシン目を破って開けてください。

③開封後の状態

『開封口』と表示されたフラップを箱の中に差し込むと、『開封済』表示が表にでる

注意：以下の場合はすでに開封されている可能性があります。



ミシン目が切れている

封緘テープ（開封用ジッパーあり）
＜例＞トロンビン液モチダソフトボトル１万

未開封の確認方法及び正しい開封方法



①未開封の状態

- ✓ ミシン目が切れていないこと
- ✓ 封かんテープがしっかり貼付されていること
- ✓ 箱全体に不自然な破れ等が無いこと

を確認してください。



②開封方法

ミシン目に沿って引いて開けてください。



③開封後の状態

注意：以下の場合はすでに開封されている可能性があります。

ミシン目が切れている

テープが切れている、
または、剥がれている