


慢性疼痛に

トラムセツト[®]配合錠を 服用される患者さんへ



持田製薬株式会社

MOCHIDA

トラムセット® 配合錠を 服用される患者さんへ

トラマドール塩酸塩

アセトアミノフェン



トラムセット® 配合錠

トラムセット® 配合錠は、トラマドール塩酸塩とアセトアミノフェンという痛みをおさえる2つの有効成分が配合されています。**他のくすりにこれらの成分が含まれている場合もありますので、病院・薬局でくすりをもらう時には医師・薬剤師にトラムセット® 配合錠を服用していることをお伝えください。**特にアセトアミノフェンは、解熱鎮痛薬や総合感冒薬に含まれていることがありますので、十分にご注意ください。

服用時の注意

- ・通常、1回1錠、1日4回を空腹時を避けて服用します。症状に応じて増減されますが、1回2錠、1日8錠を超えて服用しないでください。いずれの場合も、医師の指示通りに服用してください。
- ・アスピリン喘息のある人、または過去にアスピリン喘息があった人は1回1錠のみ服用します。
- ・服用間隔は4時間以上空けてください。
- ・飲み忘れた場合は、気が付いた時にできるだけ早く1回分服用してください。ただし、次の服用は4時間以上空けてください。絶対に2回分を一度に服用してはいけません。
- ・誤って多く服用した場合は、すぐに医師や薬剤師にご相談ください。
- ・**飲酒は避けてください。多量のアルコールによって副作用が出やすくなります。**
- ・**自分の判断で服用を中止しないでください。**

保管について

- ・乳幼児、子供の手の届かないところに保管してください。
- ・くすりが残った場合は、保管しないで廃棄してください。
- ・**他の人には絶対に渡さないでください。**

副作用について

主な副作用として、吐き気、嘔吐、傾眠、便秘、めまいなどが報告されています。

【便秘】

下剤と一緒に服用していただくことがあります。

【吐き気・嘔吐】

飲み始めの時期にあらわれることがあります。

1～2週間でなくなることが多いですが、おさまらない場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

【眠気・めまい】

飲み始めの時期にあらわれることがあるので、トラムセット® 配合錠を服用しているときは、自動車の運転や危険を伴う機械の作業などは避けてください。眠気やめまいがとれない場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

トラムセット® 配合錠を服用中に何か気になることがありましたら、
医師または薬剤師に速やかにご相談ください。

痛みの治療について

痛みは通常、「痛いところに何か異常(病気やケガなど)がある」という体からのサインです。このようなサインは、その異常が治れば消えていきます。

しかし、その異常が治らなかったり、治っても痛みだけが残ると、痛みのある状態が長く続きます。このような長引く痛みは、「^{まんせいとうつう}慢性疼痛」と呼ばれています。痛みのために、普段の何気ない動作がしづらくなったり、夜眠れなくなったり、ときには不安を感じたりします。

ですから、痛みを取り除くための治療は、通常的生活を取り戻すために行われます。

痛みの治療には、痛みの原因に対する治療とあわせて、痛み止めのくすりを使います。

「トラムセット®配合錠」について

トラムセット®配合錠は、**慢性疼痛**に対して使用する痛み止めのくすりです。痛いときにだけ服用するくすりとは異なり、きちんと服用し続けることで長引く痛みをおさえます。自分の判断で多く服用したり、中止したりせず、医師の指示通りに服用しましょう。

また、吐き気や眠気などの副作用が飲み始めの時期に出ることがあります。数日～2週間程度でおさまることが多いです。症状が強いときは医師または薬剤師に相談しましょう。

トラムセット®配合錠による治療のイメージ

