

モビコール[®]配合内用剤LD・モビコール[®]配合内用剤HDを服用される方へ

モビコール[®]は水に溶かして飲むお薬です



モビコール[®]を溶かした後は、なるべく速やかに服用してください。

LDは、1包あたりコップ1/3杯程度(約60mL)、
HDは、1包あたりコップ2/3杯程度(約120mL)の水に溶かします。



1回あたりのモビコール[®]の服用量と溶かす水の量の目安

モビコール[®]配合内用剤LD

1包： + 60mL 

2包： + 120mL 

3包： + 180mL 

4包： + 240mL 

モビコール[®]配合内用剤HD

1包： + 120mL 

2包： + 240mL 

●LD2包はHD1包に置きかえられます。 ●2歳以上7歳未満の幼児および7歳以上12歳未満の小児では、1回量として服用できるのはLD2包(HD1包)までです。

- 溶かした後すぐに服用できない場合は、ラップなどでフタをして、冷蔵庫で保管してください。
- 溶かした後、一度にすべて服用しきれない場合は数回に分けて服用してもかまいません。その場合は、1日あたりの服用量をその日中に飲みきるようにしてください。


味が気になって服用しにくい場合

水以外の飲料に溶かして服用することもできます。
水以外の飲料に溶かした後も、なるべく速やかに服用してください。

モビコール®配合内用剤LD・モビコール®配合内用剤HDを溶かしたとき 水に溶かした時と比べて塩味・苦みが小さくなると評価※1された飲料※2-4

甘みがあるもの

- Newヤクルト
- カルピスウォーター
- 森永 ミルクココア
- なっちゃん りんご
- なっちゃん オレンジ
- 明治ブルガリア 飲むヨーグルト プレーン
- ポカリスエット
- ジョア プレーン
- ミツ矢サイダー
- 野菜生活100 Smoothie 豆乳バナナMix




甘みのないもの

- お〜いお茶
- 明治おいしい牛乳
- ブレンディ ボトルコーヒー 無糖



塩味があるもの

- クノール カップスープコーンクリーム
- 永谷園 あさげ
- 玉露園 梅こんぶ茶
- 永谷園 松茸の味お吸いもの
- カゴメトマトジュース



※1: 味覚センサーによる。

※2: 医療現場から「塩っぱさを感じる」との意見があったことから、水あるいは種々飲料物にモビコール®を溶解した溶液について、味覚センサーを用いて塩味および苦みを評価した(n=3)。

※3: モビコール®の溶解には、これらの飲料を4℃もしくはあらかじめお湯に溶いた後40℃に調節したものをを用いた。

※4: 味覚変化を評価した結果であり、水以外の飲料に溶解し服用することを積極的に推奨するものではありません。

持田製薬社内資料 モビコール®配合内用剤(飲料物溶解時の味覚変化に関する社内資料)から抜粋



持田製薬株式会社