

## 適正使用のお願い

口腔・食道カンジダ症治療剤

# フロリードゲル経口用2%

(ミコナゾール・ゲル剤)

## —併用禁忌薬剤 ご注意のお願い—

2019年1月  
持田製薬株式会社

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社製品「フロリードゲル経口用2%」（以下、本剤）につきましては、平成28年10月18日付厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知に基づき、「ワルファリンカリウム投与中の患者」を「禁忌」および「併用禁忌」に追加記載しましたが、添付文書改訂後も併用禁忌薬剤（ワルファリンカリウム）との併用症例が報告されております。本剤とワルファリンカリウムは併用禁忌であることから、それぞれの薬剤を処方または調剤頂く際には、患者様の併用薬剤をご確認くださいますようお願い申し上げます。

謹白

## 本剤とワルファリンとの併用は禁忌

ですので以下の点に注意してください。

- 本剤投与開始にあたっては、あらかじめワルファリン服用の有無を確認してください。
- ワルファリンを服用している場合は、ワルファリンの治療を優先し、本剤を投与しないでください。

本剤の使用に際しては、最新の添付文書全文をご確認ください。

■添付文書記載内容（該当箇所のみ抜粋）

＜フロリードゲル経口用2%＞

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

2. ワルファリンカリウム、ピモジド、キノジン、トリアゾラム、シンバスタチン、アゼルニジピン、ニソルジピン、プロナンセリン、エルゴタミン酒石酸塩、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩、リバーロキサバン、アスナプレビル、ロミタピドメシル酸塩を投与中の患者（「相互作用」の項(1)参照）

3. 相互作用

(1) 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ワルファリンカリウム ワーファリン	ワルファリンの作用が増強し、重篤な出血あるいは著しい INR 上昇があらわれることがある。また、併用中止後も、ワルファリンの作用が遷延し重篤な出血を来したとの報告もある。患者がワルファリンの治療を必要とする場合は、ワルファリンの治療を優先し、本剤を投与しないこと。	ミコナゾールがワルファリンの代謝酵素であるチトクロームP-450を阻害することによると考えられる。

最新の添付文書は弊社ホームページ（<http://www.mochida.co.jp/>）にてご覧いただけます。

■患者様向け服用の手引きについて

本剤の「服用の手引き」において、「併用禁忌」、「併用注意」に該当する薬剤名（一般名）の記載がありますので、患者様へのご説明の際にご活用ください。ご入り用の際は弊社担当MRまでお申し付けください。

このお薬を服用中に他の病状にかかる場合には、下の内容を主治医又は薬剤師の方にお知らせください。

この方は現在、抗真菌剤 ミコナゾール（一般名）を服用しています。

**ミコナゾールと併用してはいけない薬剤**

- ワルファリンカリウム
- ピモジド
- キノジン
- トリアゾラム
- シンバスタチン
- アゼルニジピン
- ニソルジピン
- プロナンセリン
- エルゴタミン酒石酸塩
- ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩
- リバーロキサバン
- アスナプレビル
- ロミタピドメシル酸塩

**ミコナゾールとの併用に注意すべき薬剤**

- 経口血糖降下剤  
（グリベンクラミド、グリクワリド、アセヘキサミド等）
- フェニトイン
- カルバマゼピン
- ドセタキセル
- バクソキセル
- イリナクタン（経口錠水和物）
- シタラピリン
- タクロリムス水和物
- プロチナラム
- アトルバスタチン
- ビンカルカライド系抗悪性腫瘍剤（ビンクリスチン等）
- ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗剤（ニフェジピン等）
- ベラパミル
- シルベスタチン
- アルブゾラム
- ミダゾラム
- プロチナラム
- メチルプレドニゾン
- セレネリン
- エバスタチン
- イマタニブメシル酸塩
- シンベラミド
- シロスタスタール
- 4-Nプロチナーゼ阻害剤（インジナビル硫酸塩、エタナール硫酸塩、サキナビルメシル酸塩、リトナビル等）

不明な点がありましたら、主治医か薬剤師にご相談ください。

病医院名

2017.10.14#623#25 07 Q10

持田製薬株式会社

## 同種同効薬一覧

- ワルファリンを服用している場合は、ワルファリンの治療を優先し、本剤を投与しないでください。
- ワルファリンを服用している患者様の治療の際に、下記の同種同効薬一覧を参考にしてください。

ミコナゾール製剤（フロリードゲル経口用 2%、フロリード F 注 200mg）の同種同効薬を以下に示しました。これらの薬剤の中には、ワルファリンとの薬物相互作用を来す可能性のある薬剤も含まれています。投与にあたっては、各薬剤の最新の添付文書全文を必ずご参照ください。

一般名 <sup>注)</sup>	代表的な剤型	効能・効果（抜粋）	添付文書におけるワルファリンとの相互作用関連の記載
イトラコナゾール	シロップ剤	真菌感染症 〔適応菌種〕 アスペルギルス属、カンジダ属、クリプトコックス属 〔適応症〕 真菌血症、呼吸器真菌症、消化器真菌症、尿路真菌症、真菌髄膜炎、口腔咽頭カンジダ症、食道カンジダ症	「慎重投与」、「重要な基本的注意」、及び「併用注意」に「ワルファリン」の記載
フルコナゾール	ドライシロップ剤 カプセル剤	カンジダ属及びクリプトコッカス属による下記感染症 真菌血症、呼吸器真菌症、消化管真菌症、尿路真菌症、真菌髄膜炎	
ホスフルコナゾール	注射剤	カンジダ属及びクリプトコッカス属による下記感染症 真菌血症、呼吸器真菌症、消化管真菌症、尿路真菌症、真菌髄膜炎	
ボリコナゾール	ドライシロップ剤 錠剤	下記の重症又は難治性真菌感染症 ・侵襲性アスペルギルス症、肺アスペルギローマ、慢性壊死性肺アスペルギルス症 ・カンジダ血症、食道カンジダ症、気管支・肺カンジダ症 ・クリプトコックス髄膜炎、肺クリプトコックス症	
アムホテリシン B	シロップ剤 錠剤	消化管におけるカンジダ異常増殖	「ワルファリン」の記載なし
	注射用製剤	有効菌種 アスペルギルス、カンジダ、クリプトコッカス、コクシジオイデス 適応症 上記真菌による深在性感染症	
カスポファンギン酢酸塩	凍結乾燥注射剤	カンジダ属又はアスペルギルス属による下記の真菌感染症 ・食道カンジダ症 ・侵襲性カンジダ症 ・アスペルギルス症（侵襲性アスペルギルス症、慢性壊死性肺アスペルギルス症、肺アスペルギローマ）	
ミカファンギンナトリウム	注射剤	アスペルギルス属及びカンジダ属による下記感染症 真菌血症、呼吸器真菌症、消化管真菌症	
フルシトシン	素錠	有効菌種 クリプトコックス、カンジダ、アスペルギルス 適応症 真菌血症、真菌性髄膜炎、真菌性呼吸器感染症、尿路真菌症、消化管真菌症	

注) 添付文書の「効能・効果」の項において、「クリプトコックス」、「カンジダ」、「アスペルギルス」、あるいは「コクシジオイデス」による「真菌血症」、「肺真菌症」、「消化管真菌症」、「尿路真菌症」、あるいは「真菌髄膜炎」等が記載されている薬剤を記載致しました。